

ACTIVIDAD PRÁCTICA 3-2

Identificación de los componentes PES de la afirmación diagnóstica del paciente

Preguntas 1 a 5: identifique los componentes PES de cada una de las afirmaciones diagnósticas siguientes:

1. Ansiedad intensa relacionada con los cambios de la condición de salud del feto o la persona y la amenaza de muerte, según lo evidencian la inquietud, temblores y concentración en sí mismo o el feto.
P = **Ansiedad intensa** E = **Cambios de la condición de salud del feto/la persona y amenaza de muerte** S = **Inquietud, temblor, concentración en sí mismo/el feto**
2. Confusión aguda relacionada con el consumo excesivo de sustancias, según lo evidencian las percepciones erróneas, alucinaciones y agitación.
P = **Confusión aguda** E = **Consumo excesivo de sustancias** S = **Percepciones erróneas, alucinaciones, aumento de la agitación**
3. Adaptación ineficaz relacionada con la crisis de la edad madura, según lo evidencian la incapacidad para cubrir las expectativas del rol y el consumo excesivo de alcohol.
P = **Adaptación ineficaz** E = **Crisis de la maduración** S = **Incapacidad para cubrir las expectativas del rol, carencia de conducta dirigida hacia metas, consumo excesivo de alcohol**
4. Hipertermia relacionada con el incremento de la tasa metabólica y deshidratación, según lo evidencian el aumento de la temperatura, eritema cutáneo, taquicardia y taquipnea.
P = **Hipertermia** E = **Incremento de la tasa metabólica y deshidratación** S = **Elevación de la temperatura, eritema cutáneo, taquicardia y taquipnea**
5. Dolor agudo relacionado con la distensión y el edema de los tejidos, según lo evidencian las referencias verbales de dolor, conducta de defensa y cambios en los signos vitales.
P = **Dolor agudo** E = **Distensión tisular y edema** S = **Refiere dolor, conducta de defensa, y cambios en los signos vitales**
6. Explique la diferencia entre los diagnósticos existentes y de riesgo:
un diagnóstico existente o vigente es aquél que se encuentra presente y se manifiesta por signos y síntomas. Al registrar la necesidad o la inquietud, debe recurrirse a una afirmación diagnóstica de tres partes. Un diagnóstico de riesgo es uno que la enfermera sospecha podría desarrollarse, pero puesto que aún no se presenta, no existen signos o síntomas, sino sólo “factores de riesgo”. De esta manera, la necesidad se redacta como una afirmación de dos partes.
7. Dé un ejemplo de una necesidad real y una por riesgo para un paciente con quemaduras de segundo grado de la mano:
Real: Compromiso de la integridad cutánea; Dolor agudo; Defectos para el autocuidado; Conocimiento deficiente: necesidades terapéuticas
De riesgo: Riesgo de infección; Riesgo de compromiso de la adaptación; Riesgo de alteración de la imagen corporal